

メトレキサート錠2mg「タナバ」を服用される患者様へ

*効能・効果は、「局所療法で効果不十分な尋常性乾癬」「乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」です。

大切なこと

- このお薬は毎日のものではなく、服用しない日を必要とします。
- 必ず主治医・薬剤師の指示にしたがって、**1週間のうち決められた日にだけ**服用してください。
- 1回にのむ錠剤の数についても、主治医・薬剤師の指示を守りましょう。

のみ方の例

(のむ曜日は主治医・薬剤師の指示にしたがってください。)

1週間に**1回**のみ場合

●：お薬をのむとき

月			火	水	木	金	土	日
朝8:00	昼	夕20:00						
●			← お薬をのまない日 →					


1週間に**2回**のみ場合

月			火	水	木	金	土	日
朝8:00	昼	夕20:00						
●		●	← お薬をのまない日 →					

1週間に**3回**のみ場合

月			火			水	木	金	土	日
朝8:00	昼	夕20:00	朝8:00	昼	夕					
●		●	●			← お薬をのまない日 →				

お薬をのむスケジュール



お薬のシートに書かれた
月日・曜日に
おのみください。

メトトレキサート錠2mg「タナバ」を服用される患者様へ

*効能・効果は、「局所療法で効果が不十分な尋常性乾癬」「乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症」です。

この薬のはたらき

関節リウマチや乾癬による免疫異常を正常に近づけることにより、炎症をやわらげたり、関節破壊の進行を遅らせたりする治療薬です。



次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、肝臓、腎臓の病気がある人、肺の病気になったことがある人、感染症や水痘（みずぼうそう）にかかっている人、アルコールを常飲している人
- 以前に薬をのんで発疹などが出たことのある人
- ほかに薬を使っている場合（薬局で買った薬も）

注意事項

- 1週間単位で決められた日時に、決められた量を服用してください。
- 効果が得られるまでに1～2カ月かかる場合がありますので、「効果がでない」「症状が治まっている」などの理由から、**自分の判断で服用を中止したり、服用量を変更しないでください。**
- **のみ忘れたときは、忘れた分はのまず、次の服用時から決められた量だけおのみください。**
- 誤って多くのんだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- このお薬をのんでいる間は妊娠しないでください。男性の場合は、配偶者が妊娠しないようにしてください。
- このお薬をのんでいる間は、なるべくお酒を控えてください。
- 主治医の指示にしたがって定期的に検査を受けてください。

服用後、次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

■カゼのような症状

熱、咳、喉の痛み、息切れ、息苦しい など



■からだ全体の調子

からだがだるい、疲れやすい、食欲がない、お腹がひどく痛む、下痢、吐き気、むくみ、めまい、尿量が減る など

■皮膚の異常

発しん、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、青あざ、皮下出血 など



■その他

口内炎、出血しやすい（鼻血、歯ぐきの出血など）、皮膚や白目が黄色くなる など

他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。