

クレメジン速崩錠500mgを服用される方へ

このお薬は腎臓が悪くなるのを遅らせる働きがあります。

ほかにお薬が処方されている場合には、時間をずらし
30分～1時間後に、このお薬をお飲みください。

服用時の注意点

- クレメジン速崩錠500mgを服用する際、錠剤を口の中に入れ、水で崩壊させて(柔らかくして)から飲み込んでください。
- 気管に入らないようご注意ください。
- 口の中に残ったお薬は、そのまま飲み込むか、水を少し飲んで、口の中をゆすぐようにして飲み込んでください。
- 入れ歯、歯の治療中の方は、隙間に入らないようご注意ください。
- このお薬を机や床にこぼした時は、早めにタオルなどで拭き取るか、掃除機で吸い取るようにしてください。
※皮膚等に触れても害はありません。
- 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談ください。

-
- ・吐き気や便秘・下痢、腹痛などの消化器症状が強い時
 - ・その他、お薬のことや体調のことで、気になることや、わからないことがあった時
 - ・お薬がどうしても飲みにくい時
-



クレメジン速崩錠500mgを上手に服用するために



クレメジン速崩錠500mgの袋をキリトリ線(ミシン目)に沿って開けます。

開けにくい場合は、ハサミなどを使って開けてください。



錠剤1錠を舌の真ん中あたりに置きます。気管(空気が肺に入る通り道)に入らないように注意してください。



少量の水を口に含みます。



すぐに飲み込まず、薬が舌の上ですこし柔らかくなったら、水と一緒に飲み込みます。

口の中でお薬が広がってしまってもそのまま水で飲み込んでください。

4錠目(1回分)まで同じようにお飲みください。
慣れてきたら複数の錠剤を服用することも可能です。

動画でご覧になれます。
右のQRコードをスマートフォンなどで読み込んでください。

