

# 若年性特発性関節炎

## メトトレキサート錠2mg「タナバ」を服用される患者様へ

### 大切なこと

- このお薬は毎日のものではなく、服用しない日を必要とします。
- 必ず主治医・薬剤師の指示にしたがって、1週間のうち決められた日にだけ服用してください。
- 1回にのむ錠剤の数についても、主治医・薬剤師の指示を守りましょう。

### のみ方の例

(のむ曜日は主治医・薬剤師の指示にしたがってください。)

#### 1週間に1回のみ場合

●：お薬をのむとき

月			曜日						
朝8:00	昼	夕20:00	火	水	木	金	土	日	
●			← お薬をのまない日 →						


#### 1週間に2回のみ場合

月			曜日						
朝8:00	昼	夕20:00	火	水	木	金	土	日	
●		●	← お薬をのまない日 →						

#### 1週間に3回のみ場合

月			火			曜日				
朝8:00	昼	夕20:00	朝8:00	昼	夕	水	木	金	土	日
●		●	●			← お薬をのまない日 →				

### お薬をのむスケジュール




お薬のシートに書かれた  
月日・曜日に  
おのみください。

# 若年性特発性関節炎

## オトレキサート錠2mg「タナバ」を服用される患者様へ

### 効能・効果

関節症状を伴う若年性特発性関節炎



### 次の人は主治医に相談してください。

- 妊娠中、授乳中または妊娠を希望する人
- 血液、肝臓、腎臓の病気がある人、肺の病気になったことがある人、感染症や水痘(みずぼうそう)にかかっている人、アルコールを常飲している人
- 以前に薬をのんで発疹などが出たことのある人
- 他に薬を使っている場合(薬局で買った薬も)

### 注意事項

- 1週間単位で決められた日時に、決められた量を服用してください。
- 効果が得られるまでに1~2カ月かかる場合がありますので、「効果がでない」「症状が治まっている」などの理由から、**自分の判断で服用を中止したり、服用量を変更しないでください。**
- **のみ忘れたときは、忘れた分はのまず、次の服用時から決められた量だけおのみください。**
- 誤って多くのんだ場合は、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- このお薬をのんでいる間は妊娠しないでください。男性の場合は、パートナーが妊娠しないようにしてください。
- このお薬をのんでいる間は、なるべくお酒を控えてください。
- 主治医の指示にしたがって定期的に検査を受けてください。

服用後、次のような症状に気づき、異常を感じたら、使用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。

#### ■お腹の症状

吐き気、腹痛、下痢 など



#### ■その他の異常

むくみ、尿の量が減る、口内炎、体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる、めまい、食欲がない、むかむかする、顔色が白くなる など



#### ■風邪のような症状

発熱、のどが痛い、咳、息苦しい など



他にも何か異常を感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。