

オキナゾール膣錠を使用されている方へ 〈膣錠の使い方〉

抗真菌剤

薬価基準収載

オキナゾール[®] 膣錠100mg・600mg

OKINAZOLE VAGINAL TABLETS 100mg・600mg (オキシコナゾール硝酸塩膣錠)



田辺三菱製薬

オキナゾール膣錠を使用されている方へ

外陰腔カンジダ症



カンジダというは真菌類しんきんるい(カビの仲間)の一種です。
カンジダが外陰部及び腔に寄生して炎症を起こす病気を外陰腔カンジダ症といいます。

健康状態やホルモンのバランスがくずれたとき、妊娠しているとき、抗生物質をのんだあとなどにかかりやすく、白色のおりものが増え、外陰部がかゆくなるのが特徴です。
この薬はこの病気を治そうとするものです。

- 1 薬剤の効果を持続させるために、自分で腔内を洗わないこと。
- 2 治療中はなるべく性行為を避け、やむを得ない場合は、感染を防ぐためにコンドームを使用すること。
- 3 入浴時に石けんの刺激を避けるために、外陰部はお湯だけで洗うこと。
- 4 下着は患部がむれない綿製品などを用いること。
- 5 症状がなくなっても菌がまだ寄生していることがあるので、医師の指示に従って根気よく治療を受けること。

病・医院名


裏面もご覧ください。

〈腔錠の使い方〉

この薬は飲まないでください。


腔錠の 取り出し方

矢印の方向に指で押して、
腔錠を取り出してください。



腔錠の 正しい挿入法

両足を広げてしゃがみ、
図のように人差し指の頭に腔錠をのせ、
腔内の最も深いところに挿入します。



腔錠挿入時の注意

- 薬の表面に油などを塗らないようにしてください。
- 手指をきれいに洗ってから挿入してください。
- 挿入後、患部に接触した手指は石けんでよく洗ってください。

