

クレメジン[®]細粒分包2g を服用される方へ

クレメジン細粒分包2gを処方された患者さんの正しい服薬指導のためにご活用ください。



田辺三菱製薬

クレメジン細粒分包2gを服用される方へ

このお薬は腎臓が悪くなるのを遅らせる働きがあります。

ほかにお薬が処方されている場合には、時間をずらし30分～1時間後に、このお薬をお飲み下さい。

服用時の注意点

最初、口の中を少量の水で湿らせておき、お薬を口の中へ移します。その後、一気に水で飲むようにして下さい。

☆ 気管に入らないように注意して下さい。

☆ 口の中に残ったお薬は、そのまま、飲み込むか、うがいをして口から出すようにして下さい。

☆ 入れ歯、歯の治療中の方は、隙間に入らないよう注意して下さい。

1. このお薬を机や床にこぼした時は、早めにタオルなどで拭き取るか、掃除機で吸い取るようにして下さい。

なお、皮膚等に触れても、害はありません。

2. 次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい。

☆ 吐き気や便秘・下痢、腹痛などの消化器症状が強い時

☆ その他、何か気付いた点があった時や、わからないことがあった時

☆ 飲みにくい時

クレメジン細粒分包2gをじょうずに服用するために

薬局・薬店で販売されている「フクロオブラート」に移して飲むことも可能です。

フクロオブラートを使ったクレメジンの飲み方

①



お薬をこぼさないように
フクロオブラートに移す。

②



上の部分をねじって細長くし、
飲みやすくする。

③



コップにそそいだ水に約1秒位浸し、
そのあと少量の水で服用します。

