

# テオドールをお飲みになる お子様の保護者の方へ

このお薬は、気管支を広げる作用などにより、気管支喘息、喘息性（様）気管支炎による息苦しさ等をおさえるお薬です。このお薬をお飲みになる前に、ご確認いただきたいことがありますので、下記をお読み下さい。

## ● このお薬でみられやすい好ましくない作用（副作用）

お薬は、目的とする作用以外に好ましくない作用（副作用）があらわれることがあります。このお薬でみられやすい好ましくない作用（副作用）は、はきけがする、食欲がない、興奮する、寝つきが悪くなるなどの症状です。

## ● 発熱したとき

発熱している状態でこのお薬を飲むと副作用があらわれやすくなります。発熱時の服用方法については、主治医の先生にご相談ください。

## ● 飲ませ方について

発作が治まらないから、飲み忘れたからといって2回分を一度に飲ませないでください。飲ませる間隔を短くするのも避けてください。副作用があらわれやすくなります。

## ● 他のお薬との飲み合わせ

他のお薬との飲み合わせによっては、このお薬の作用が強まったり、弱まったりすることがあります。主治医の先生以外からお薬をだして頂くときや薬局でお薬を買うときは、テオドールを飲んでいることをお伝え下さい。

副作用があらわれたとき、お子様の様子がいつもと違うなと感じたときには、主治医の先生または薬剤師にご相談ください。



田辺三菱製薬株式会社

TOD-364A-  
2023年5月作成  
(審)23V088