

# ラジカットによる筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療を受けられる 患者さん用チェックシート

## 投与中に気をつけていただきたい症状

ALSの病状進行にともなって、「からだがだるい」「疲れやすい」「ふらつく」「息苦しい」「食欲がない」などの症状がでてくる場合があります。これは薬剤による副作用の症状と紛らわしく、判断に迷うこともあるかと思えます。そのような場合は、主治医にご連絡ください。

## ラジカットの投与中および投与後、特に気をつけていただきたい症状

ラジカットによる治療を受けている患者さんは、以下の症状がないかどうか、ご確認ください。下線は、ご家族または介護をされている方にも気をつけていただきたい症状です。

あてはまる症状がある場合には□にチェック☑をつけて、主治医や看護師、薬剤師などの医療スタッフにご相談ください。

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 患者さんの氏名：                                | (生年月日： 年 月 日生、 歳)           |
| <small>*患者さんご本人が確認される場合は記載不要です。</small> |                             |
| 確認者の氏名：                                 | (患者さんとのご関係：ご家族、介護の方、その他( )) |
| 確認日： 年 月 日( 時)                          | 確認場所：ご自宅、病院、その他( )          |

### 全身

- からだのだるい、疲れやすい、脱力感
- むくみ
- ふらつき
- 発熱
- 冷汗が出る
- 寒気、体重の増加、  
出血が止まりにくい、力が入らない

### 頭部

- 頭痛
- めまい
- 意識の消失
- 意識の低下

### 顔面

- 顔面蒼白(そうはく)
- 鼻血

### 眼

- 白目が黄色くなる



裏面もご覧ください。

## 口・のど

- 喉の痛み
- 喉のかゆみ
- 咳
- 痰
- 歯ぐきの出血
- 吐き気
- 血を吐く

## 胸部

- 息苦しい
- 息切れ
- 動悸

## 腹部

- 食欲不振
- お腹が張る

## 手・足

- 手足が冷たくなる
- 手足のしびれ
- 手足のこわばり

## 皮膚

- あおあざができる
- 全身のかゆみ
- じんま疹
- 皮膚が黄色くなる

## 筋肉

- 筋肉の痛み

## 尿

- 血尿
- 尿量が減る
- 尿が赤褐色になる
- 尿の色が濃くなる
- 排尿時の尿の泡立ちが強い
- 尿が赤みを帯びる

## 便

- 便に血が混じる



このほかにも気になる点がありましたら、主治医にご相談ください。

## MEMO

---

---

---

---

---